

ArtiAid Plus[®] 優節益

醫師為何開此藥？

治療退化性膝關節炎疼痛患者，限用於保守性非藥物治療及一般鎮痛劑如 (Acetaminophin) 無效時使用。

如何使用此藥？

由醫師操作使用。

需使用適當的無菌針頭(20 號針頭)注射至關節腔，

每週一針，連續 3 週，

注射時，必須遵守無菌操作過程，若關節腔有滲出液時，請先以空針將關節液抽出。

使用此藥應該注意什麼？

1. 應多休息，

局部施用溫熱敷，保護關節，避免過度活動如爬山、跑步、上下樓梯等劇烈運動，以避免或減輕膝關節負重。

2. 需多次治療者，加強注意局部衛生，防止因傷口及關節腔再度感染。

此藥品可能引起的副作用及處理方式：

注射之後隔數小時至數天內，有局部關節產生疼痛、腫脹的現象，此情形通常可自行緩解。

除了針劑的刺痛外，玻尿酸的副作用極低。

極少數會發生嚴重的過敏反應，造成關節嚴重腫脹疼痛，但皆能復原。

【Sodium hyaluronate】

中文名：

優節益關節內注射劑

英文名：

**ArtiAid Plus Intra-articular
Injection**

用藥指導單張無法詳盡關節內注射劑的全部資訊，若您有任何服藥之問題，請諮詢您的醫師或詢問藥師。

諮詢電話：**(07)6156555 轉 122**
燕巢靜和醫院藥劑科 關心您