

BHL[®] 顫立靜 Switane[®] 瑞丹

醫師為何開此藥？

用來控制帕金森氏病的症狀。
此藥也可能用於治療其他病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

此藥該如何使用？

請配合醫師指示服藥，
如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。
未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。

使用此藥時該注意什麼？

1. 本品不可使用於狹角性青光眼患者，並且須定期監測眼內壓。
2. 心、肝、腎功能受損者，應細心監測，長期觀察。
3. 不可突然停藥，以免導致症狀加重。

此藥品可能引起的副作用及處理方式：

若有以下症狀發生嚴重的情形或是無法消除時，請盡快告知您的醫師：

嗜睡、頭暈或視力模糊、口乾、腸胃不適、嘔吐、腹瀉、便秘、增加眼睛對光敏感度、小便困難。

若您有下列任一症狀，請立刻通知醫師：

皮膚疹，心跳過快、不規律或心悸，發燒、意識混亂、憂鬱症、幻想或幻覺、眼睛疼痛。

忘記服藥時該怎麼辦？

儘可能在您想起時，立刻補服一個劑量；

但若幾乎到吃下一個劑量的時間，那就略過前次劑量，而在下次用藥時間服藥。

不要為了補吃錯過的劑量而服用雙倍劑量。

我該如何儲存這個藥品？

請儲存於室溫下且孩童拿不到的地方，避免陽光照射與潮濕。

【Trihexyphenidyl】

中文名：

顫立靜 5 毫克

"瑞士"瑞丹錠 2 毫克

英文名：

BHL 5mg/tab

SwiTane 2mg/tab

用藥指導單張無法詳盡

Trihexyphenidyl 的全部資訊，
若您有任何服藥之問題，請諮詢
您的醫師或詢問藥師。

諮詢電話：**(07)6156555 轉 122**

燕巢靜和醫院藥劑科 關心您