

Binin-U[®] 易寧優錠

為什麼我要使用這個藥？

本藥為精神神經安定劑，可用於治療躁動、瞻妄或攻擊性與破壞性之行為障礙。

我該如何使用這個藥？

請遵照醫師或藥師指示服藥。
請勿擅自停藥。

當使用這個藥品，我該注意什麼？

1. 服藥後可能會讓您感覺頭昏、嗜睡或產生幻覺，在尚未確認您對這類藥物的反應前，請盡量避免從事需全神貫注或可能造成危險之相關活動，如開車、操作機械等。

2. 服藥期間請勿飲酒。
3. 請告訴醫師或藥師您正在服用的其他藥物；若有肝功能不良、甲狀腺機能亢進、癲癇、帕金森氏症等疾病或嚴重之心臟病者，就診時請務必告知醫師，由醫師評估是否可使用。
4. 此類藥物不建議使用於孕婦及產後哺乳、若妳計畫懷孕或已懷孕或正在哺乳，就診時請務必告知醫師。
5. 服藥後可能導致低血壓，服藥期間請密切注意血壓與心跳，並定期回診追蹤心電圖。

使用這個藥品有可能會出現那些副作用？

食慾不症、噁心、月經異常、體重增加、口渴、鼻塞、倦怠感。

當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：錐體外徑症狀（僵直、震顫）、遲發性的運動困難（舌下、面部、嘴或下巴不自主運動）等，請立即就醫。

忘記服藥時該怎麼辦？

想起時，立即服用；若已接近或已到下一次服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

我該如何儲存這個藥品？

置於小孩子拿不到的地方。將藥物儲存在室溫，遠離高溫、高溼度(不要放置於浴室)和直接的陽光照射。將過期或不再需要的藥物丟棄，請教藥師如何適當處理此藥。

【Haloperidol】

中文名：

易寧優錠 2 毫克

易寧優錠 5 毫克

易寧優錠 10 毫克

英文名：

BinIN-U 2mg(粉)

Binin-U 5mg(綠)

BINin-U 10mg(藍)

用藥指導單張無法詳盡

Haloperidol 的全部資訊，若您有任何服藥之問題，請諮詢您的醫師或詢問藥師。

諮詢電話:(07)6156555 轉 122

燕巢靜和醫院藥劑科 關心您