

# Clonopam<sup>®</sup> 克癲平錠

## 為什麼我要使用這個藥？

控制癲癇發作、緩和焦慮相關症狀。

## 我該如何使用這個藥？

請遵照醫師或藥師指示服藥。

請勿擅自停藥。

## 當使用這個藥品，我該注意什麼？

1. 服藥後，請勿開車或操作危險機械及從事需要集中注意力的工作。
2. 服藥期間請勿飲酒，酒精會加重此藥導致的嗜睡作用。
3. 不可擅自突然停藥，可能引發戒斷症狀（焦慮、失眠、易怒等）或加重癲癇，若需停藥，

請遵照醫師指示逐漸減量。

4. 老年人對本藥較敏感，可能會增加白天昏昏欲睡、意識混淆之副作用的機會，服藥期間應密切注意。

## 使用這個藥品有可能會出現那些副作用？

嗜睡、暈眩、疲倦、頭痛、噁心、皮膚癢、情緒不穩。

這些作用通常是短暫性的，在治療的過程中或降低劑量下普遍會自然消失。但症狀嚴重或持續時，請先與醫師或藥師聯絡可於回診時告知醫師。

## 忘記服藥時該怎麼辦？

想起時，立即服用；若已接近或已到下一次服藥時間，只需服用

下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

## 我該如何儲存這個藥品？

置於小孩子拿不到的地方。將藥物儲存在室溫，遠離高溫、高溼度(不要放置於浴室)和直接的陽光照射。將過期或不再需要的藥物丟棄，請教藥師如何適當處理此藥。

## 【Clonazepam】

中文名：

克癩平錠 2 毫克

克癩平錠 0.5 毫克

英文名：

CLONOpam 2 毫克

Clonopam 0.5mg

用藥指導單張無法詳盡

**Clonazepam** 的全部資訊，若您有任何服藥之問題，請諮詢您的醫師或詢問藥師。

諮詢電話：(07)6156555 轉 122

燕巢靜和醫院藥劑科 關心您