

Clopine[®]克慮平錠 Zapine[®]來特平錠

醫師為何開此藥？

治療思覺失調症。

此藥該如何使用？

請配合醫師指示服藥，

如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。

未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。

使用此藥時該注意什麼？

1. 患有癲癇病史、肝病、青光眼、心血管疾病、攝護腺腫大、排尿困難、乳癌、嚴重便秘或正在服用其他藥品者請先告知醫師。
2. 請勿喝酒精性飲料。
3. 可能會讓您感到困倦、頭暈，在未確定它對您有任何影響之前，請勿開車或操作危險機械。
4. 香菸可能會降低本藥在人體內的藥量，請讓醫師知道您是否抽菸。
5. 可能會讓您感到頭暈、昏眩，尤其是突然起床或站立時，請慢慢起立。

此藥品可能引起的副作用及處理方式：

焦慮不安、口乾、便秘、暈眩、體重增加、發燒、心跳加速或不規則、流汗、排尿困難、肌肉僵硬、肌肉痙攣、無法站立、吞嚥困難等。

若症狀持續數日或嚴重時，請停藥或立即就醫或與醫師聯絡。

忘記服藥時該怎麼辦？

儘可能在您想起時，立刻補服一個劑量；

但若幾乎到吃下一個劑量的時間，那就略過前次劑量，而在下次用藥時間服藥。

不要為了補吃錯過的劑量而服用雙倍劑量。

我該如何儲存這個藥品？

請儲存於室溫下且孩童拿不到的地方，避免陽光照射與潮濕。

【Clozapine】

中文名：

克慮平錠 25 毫克

來特平錠 100 毫克

英文名：

Clopine 25mg/tab

Zapine 100mg/tab

用藥指導單張無法詳盡

Clozapine 的全部資訊，若您有任何服藥之問題，請諮詢您的醫師或詢問藥師。

諮詢電話：(07)6156555 轉 122

燕巢靜和醫院藥劑科 關心您