

Depakine® 帝拔癲

醫師為何開此藥？

控制癲癇或痙攣；治療某些精神病，如躁鬱症。

此藥該如何使用？

1. 本藥對口腔及喉嚨有刺激性，請整粒吞服不可嚼碎或磨粉。Depatec 500mg/tab 可剝半。
2. 請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或服藥時間。

使用此藥時該注意什麼？

1. 應遵照醫囑每日規律服藥，突然停藥可能會導致重積性癲癇（status epilepticus）發作，請確定手邊隨時有足夠的藥量。
2. 服用本藥前應先檢查肝功能，服藥後請定期檢查肝功能和血液學檢查；服用本藥期間應避免喝酒。
3. 本藥可能會讓您覺得睏倦，應避免開車或操作危險機械。
4. 孩童服用 valproic acid 時，請觀察並記錄其行為、情緒及癲癇發作情形。
5. 有下列情況時請先告知醫師：懷孕、計畫懷孕、哺乳、

有肝病者、正在服用其他藥品或曾有藥品不良反應者。

6. 手術前（包括牙科手術）請告訴醫師您正在服用本藥。
7. 本藥可能造成尿酮檢驗的錯誤判讀，有自行檢測尿糖習慣之糖尿病人請先與醫師商討。

此藥品可能引起的副作用及處理方式：

1. 腹痛、食慾不佳。
2. 困倦、嗜睡、無力、顫抖。

忘記服藥時該怎麼辦？

想起時儘快服用。

但如果很接近下次的服藥時間，則跳過一次。

照原來時間服用下一次的劑量。絕不可一次服用雙倍劑量。

【Valproic Acid】

中文名：

帝拔癲腸溶錠 200mg/tab

帝拔癲 500mg/tab

英文名：

Depakine 200mg/tab

Depakine 500mg/tab

用藥指導單張無法詳盡 **Valproic Acid** 的全部資訊，若您有任何服藥之問題，請諮詢您的醫師或詢問藥師。

諮詢電話：**(07)6156555 轉 122**
燕巢靜和醫院藥劑科 關心您