

Exprexa[®] 易得靜 Zyprexa[®] 津普速口溶錠

醫師為何開此藥？

治療思覺失調症。也可能用來於治療其他病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

此藥該如何使用？

配合醫師指示服藥，如對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。

使用此藥時該注意什麼？

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對 Olanzapine 或其他藥物有過敏的反應。
2. 請告訴醫師或藥師您正服用的藥物(包含非處方藥)。
3. 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過的疾病，如：是否有心臟病、癲癇、乳癌、肝臟疾病、攝護腺疾病、腸阻塞或青光眼。
4. 可能會導致嗜睡，在您清楚藥物可能對您的影響前不要開車或使用危險機械。
5. 酒精會加重此藥導致的嗜睡作用，服用期間請勿飲酒。
6. 抽煙會降低此藥的效果，服用此藥期間如有抽煙必須告知您的醫師。
7. 你必須知道這個藥可能會引起抗精神病藥物惡性症候群 (neuroleptic malignant syndrome)，如果您有肌肉僵硬、心智改變、出汗或心跳不規則，請立刻通知醫師。
8. 可能導致遲發性不自主運動 (tardive dyskinesia)，如果您有無法控制的痙攣動作，請立刻通知醫師。

此藥品可能引起的副作用及處理方式：

雖然 Olanzapine 副作用並不常見，但還是可能發生。若有以下症狀發生嚴重的情形或無法消除時，請告知醫師：頭痛、焦慮不安、頭暈、便秘、口乾、胃不舒服、嘔吐、腹瀉。若您有下列任一症狀，請立刻通知醫師：癲癇、無法控制的痙攣動作、發燒、肌肉僵硬、大量流汗、心跳加速或不規則。

忘記服藥時該怎麼辦？

想起時儘快服用。

但如果很接近下次的服藥時間，則跳過一次。

照原來時間服用下一次的劑量。絕不可一次服用雙倍劑量。

用藥指導單張無法詳盡

Olanzapine 的全部資訊，若您有任何服藥之問題，請諮詢您的醫師或詢問藥師。

【Olanzapine】

中文名：

津普速口溶錠 5 毫克

易得靜膜衣錠 5 毫克

易得靜膜衣錠 5 毫克

英文名：

Zyprexa 5mg/tab(口溶錠)

Olanzapine(易得靜) 5 毫克

OLANzapine(Exprexa) 10mg

諮詢電話：**(07)6156555 轉 122**

燕巢靜和醫院藥劑科 關心您