

Fallep[®]服爾眠錠

醫師為何開此藥？

鎮靜及安眠。

此藥該如何使用？

遵照醫師的指示用藥。

勿任意增減劑量或隨意自行停藥。

使用此藥時該注意什麼？

1. 自行任意停止治療可能出現反彈性失眠的短暫症狀。
2. 避免與酒精併服。
3. 可能會影響駕駛及操作機械之能力。
4. 葡萄柚汁可能會影響藥品作用。

此藥品可能引起的副作用及處理方式：

1. 常見的副作用：頭痛、胃灼熱、腹瀉、頭暈、嗜睡、虛弱、口乾。
2. 若是有以下的症狀發生嚴重的情形或是無法消除時，請儘快通知您的醫師：便秘、排尿不順、頻尿、視線模糊。
3. 若您有下列任何一種症狀，請立刻就醫：抽筋、言語困難、皮膚癢紅疹、震顫、發熱、呼吸或吞嚥困難、眼睛或皮膚發黃、心跳不正常。

忘記服藥時該怎麼辦？

若忘記服用則跳過，不要同時服用兩個劑量。

我該如何儲存這個藥品？

將藥物存放於容器中緊鎖，並置於小孩子拿不到的地方。

請儲存於室溫下且孩童拿不到的地方，避免陽光照射與潮濕。

【Flunitrazepam】

中文名：

服爾眠錠 2 毫克

英文名：

Fallep 2mg/tab

用藥指導單張無法詳盡

Flunitrazepam 的全部資訊，若您有任何服藥之問題，請諮詢您的醫師或詢問藥師。

諮詢電話：**(07)6156555 轉 122**
燕巢靜和醫院藥劑科 關心您