

Lidin[®] 立定

為什麼我要使用這個藥？

可以穩定情緒，治療躁鬱症。

我該如何使用這個藥？

請遵照醫師的指示用藥

使用時我該注意的特別事項？

1. 服用鋰鹽通常於 7 ~ 10 天才能見到療效。
2. 須規則和持續服用才有效。
3. 服用的劑量需經醫師決定，不足時其治療效果不好，過量時則會引起一些嚴重的副作用。
4. 注意水份及飲食足夠之攝取。

5. 如遇有嚴重腹瀉、發高燒或身體疾病時，需與醫師聯繫服藥問題，若未能聯繫，可暫時停藥然後再與醫師討論。
6. 服藥期間如有合併其他藥物治療，需與醫師討論所需注意事項。
7. 為確知劑量是否適當，請依照醫師安排的時間來院做定期的抽血檢查。
8. 抽血檢查時間是在前一次服藥後 10 ~ 12 小時內，需空腹抽血。
9. 準備懷孕或已懷孕，須與醫師討論服藥問題。

使用這個藥品有可能會出現那些副作用？

若症狀持續數日或嚴重時，請

停藥並立即就醫或與醫師連絡。

1. 開始治療時可能發生手部輕微顫抖、多尿、輕微口渴及身體不適現象，請告知醫師予以評估。
2. 當您發生下列症狀時，請與您的醫師聯絡：鋰中毒症狀--腹瀉、嘔吐、倦睡、肌肉無力、眩暈、運動失調、視力模糊、極度口渴、頭痛、耳鳴及多尿。

忘記服藥時該怎麼辦？

若忘記服藥，則於想起時儘快服用；

如果一天服藥超過兩次以上，若距離下次服藥時間少於 4 小時，則不需要補服，按原

時間服用即可，

切勿一次服用兩倍劑量。

我該如何儲存這個藥品？

將藥物存放於容器中緊鎖，並置於小孩子拿不到的地方。

將藥物儲存在室溫，遠離高溫、高濕度(不要放在浴室)和直接的陽光照射。

將過期或不再需要的藥物丟棄，並尋問藥師如何適當地處理此藥。

我還應該知道什麼其他資訊？

要定期回診，

讓醫生評估您治療的狀況。不要讓任何人服用您的藥物。可詢問藥師任何有關藥物再調配的問題。

用藥指導單張無法詳盡 **Lithium** 的全部資訊，若您有任何服藥之問題，請諮詢您的醫師或詢問藥師。

【Lithium】

中文名：

立定 300mg/tab

英文名：

Lidin 300mg/ tab

諮詢電話：**(07)6156555 轉 122**

燕巢靜和醫院藥劑科 關心您