

Risperdal[®]理思必妥內服液 Respor[®]理斯本內服液

醫師為何開此藥？

此藥臨床使用於精神異常引起之相關症狀。

如何使用此藥？

為 30 公撮琥珀色玻璃瓶裝，附防止兒童打開的塑膠瓶蓋。所附的滴管刻度為毫克及毫升，最小體積為 0.25 毫升，最大體積為 3 毫升。

圖 1：瓶子附有防兒童開啓之安全瓶蓋且須依下述方式開啓：

- 將塑膠轉蓋往下壓並同時逆時針方向旋轉。
- 移除瓶蓋。




圖 2：將滴管插入瓶內。




圖 3：握住下環並將上環拉至對應給藥量的毫升或毫克數字刻度。





圖 4：握住下環，將整支滴管由瓶中移出。將上環往下壓，以將滴管內的藥液排空至茶以外的非酒精性飲料。將瓶蓋蓋好。以少量的水清洗滴管。



使用此藥時該注意什麼？

1. 請告知醫師或藥師，您是否對 Risperidone 或其他藥物過敏。
2. 請勿喝茶或酒精性飲料。
3. 此藥可能會干擾需要警覺性之活動，在未恢復個人敏感度以前，請勿開車或操作危險機械。

4. 此藥可能會讓您感到頭暈、昏眩，尤其是突然起床或站立時，請慢慢起立。。

5. 此藥會分泌於乳汁，所以孕婦不應哺乳。

此藥品可能引起的副作用及處理方式：

若症狀持續數日或嚴重時，請停藥或立即就醫或與醫師聯絡。

一般常見的副作用有：躁動不安、失眠、焦慮、頭痛。

忘記服藥時該怎麼辦：

若忘記服藥，則於想起時立即補服，如果一天服藥超過兩次以上，若距離下次服藥時間少於四小時，則不需要補服，按

原時間服用即可，勿一次服用兩倍劑量。

我該如何儲存這個藥品？

請將此藥連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處儲存，請勿冷藏或冷凍。

開封後毋需冷藏可保存三個月。

請勿放在孩童可以取得之場所。

用藥指導單張無法詳盡
Risperidone 的全部資訊，若您有任何服藥之問題，請諮詢您的醫師或詢問藥師。

【Risperidone】

中文名：

理思必妥內服液劑

理斯本內服液

英文名：

Risperdal solution 滴劑

Respor 滴劑 Oral solution

諮詢電話：**(07)6156555 轉 122**

燕巢靜和醫院藥劑科 關心您