

Spiterin[®] 思特寧

醫師為何開此藥？

此藥臨床使用於精神異常引起之相關症狀。

如何使用此藥？

請遵照醫師處方服藥。

使用此藥時該注意什麼？

1. 患有癲癇病史、肝腎疾病、青光眼、心血管疾病、攝護腺腫大、排尿困難、乳癌、嚴重便秘或正在服用其他藥品者請先告知醫師。
2. 此藥會讓您感到睏倦、頭暈，在未確定它對您有任何

影響之前，請勿開車或操作危險機械。

3. 香菸可能會降低本藥在人體內的藥量，請讓醫師知道您是否抽菸。
4. 請勿喝酒精性飲料。
5. 此藥可能會讓您感到頭暈、昏眩，尤其是突然起床或站立時，請慢慢起立。
6. 此藥會分泌於人體乳汁，所以孕婦不應哺乳。



此藥品可能引起的副作用及處理方式：

常見的副作用有：焦慮不安、口乾、便秘、暈眩、體重增加、心跳加速或不規則、發燒、排尿困難、肌肉僵硬、流汗、肌肉痙攣、無法站立、吞嚥困難等。

若症狀持續數日或嚴重時，請停藥或立即就醫或與醫師聯絡

忘記服藥時該怎麼辦：

若忘記服藥，則於想起時儘快服用；

如果一天服藥超過兩次以上，若距離下次服藥時間少於4小時，則不需要補服，按原時間服用即可，

切勿一次服用兩倍劑量。

我該如何儲存這個藥品？

請將此藥連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處儲存，請勿冷藏或冷凍。請勿放在孩童可以取得之場所。

我還應該知道什麼其他資訊？

要定期回診，

讓醫生評估您治療的狀況。不要讓任何人服用您的藥物。可詢問藥師任何有關藥物再調配的問題。

用藥指導單張無法詳盡

Risperidone 的全部資訊，若您有任何服藥之問題，請諮詢您的醫師或詢問藥師。

【Risperidone】

中文名：

思特寧膜衣錠 1 毫克

思特寧膜衣錠 2 毫克

思特寧膜衣錠 3 毫克

英文名：

Spiterin 1mg(白)

Spiterin 2mg(橘)

Spiterin 3mg(黃)

諮詢電話：**(07)6156555 轉 122**

燕巢靜和醫院藥劑科 關心您