

Tegretol[®] 癲通

為什麼我要使用這個藥？

主要用於控制癲癇、痙攣、三叉神經痛及治療周邊神經病變引起的疼痛。

我該如何使用這個藥？

請遵照醫師或藥師指示服藥。

請勿擅自停藥，因突然停藥可能導致痙攣或癲癇發作。

當使用這個藥品，我該注意什麼？

1. 應按時回診，若癲癇繼續發作請與醫師連絡。
2. 若您曾對 carbamazepine 或三環抗憂鬱劑過敏，或曾有骨髓抑制之情形發生，請務必告知您的醫師，避免服用此藥。

3. 請以白開水吞服藥品。
4. 勿吃葡萄柚或飲用葡萄柚汁以及含酒精性之飲料。
5. 服用本藥可能影響病人的反應(如駕車及操作機械)。
6. 孩童服用本類藥品時，請觀察並記錄其行為、情緒、注意力、手眼協調、解決問題、思考能力及癲癇發作之情形。
7. 服藥期間應定期檢測肝功能、血液及眼睛檢查。
8. 請勿讓他人服用您的藥品。
9. 如果你正在使用單胺氧化酵素抑制劑、避孕藥及其他所有藥品，請務必告知醫師，因為這個藥品不可以跟某些藥品一起服用。

使用這個藥品有可能會出現那些副作用？

1. 如果出現發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍、容易瘀血、皮膚出現紫色斑點等情形，請立即回診告知醫師。
2. 初期，有可能會出現暈眩、頭痛、運動失調、嗜睡、疲勞、複視、噁心、嘔吐及皮膚過敏等症狀。

這些症狀不一定會發生，而且會在幾天內會逐漸消失，但如果發生以上的症狀且持續一段時間，請於回診時告知醫師。

3. 使用藥品期間可能會對光線比較敏感，容易造成皮膚紅腫、搔癢、嚴重曬傷的情形。建議外出時請使用防曬乳液，穿著防曬衣物和太陽眼

鏡，做好防曬措施。

服藥期間，若有腸胃道不舒服的症狀，建議可以和食物一起服用。

忘記服藥時該怎麼辦？

若忘記服藥，則於想起時儘快服用，

若想起時已接近下次服藥時間，則不須補服藥物，於下次的服藥時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

我該如何儲存這個藥品？

室溫下、乾燥儲存，並置於孩童不易取得處。

用藥指導單張無法詳盡

Carbamazepine 的全部資訊，若您有任何服藥之問題，請諮詢您的醫師或詢問藥師。

【Carbamazepine】

中文名：

癲通膜衣錠 200 毫克

英文名：

Tegretol 200mg/tab

諮詢電話：(07)6156555 轉 122
燕巢靜和醫院藥劑科 關心您